



Departament de Pediatria
Hospital Universitari Quirón Dexeus
C/ Anglí, 31, 2^a planta
08017 Barcelona
Tel.: 93 205 57 57
Fax: 93 205 05 23
www.pediatriadexeus.com

PROFILAXI DAVANT L'ENDOCARDITIS

Fulls d'Informació Sanitària (FIS)

En tota infecció produïda per bacteries, existeix la possibilitat que aquestes passin transitòriament a la sang. En pacients afectats per malformacions o malalties cardíques, existeix un major risc de que aquestes bacteries puguin afectar a les vàlvules o als defectes cardíacs, produint-se el que es coneix com a endocarditis bacteriana.

Per evitar-ho, sempre que el vostre fill/a pateixi un accident en el que hi hagi una ferida oberta sagnant o bruta, quan l'hagin de sotmetre a intervenció quirúrgica o en cas de procediment dental (extraccions o ortodòncia) en el que probablement pugui tenir un petit sagnat, serà necessari administrar-li un tractament antibiòtic previ i posterior.

Tot i que el seu pediatre ja ho tindrà en compte i us informarà exactament de quin antibiòtic ha de prendre, a quines dosis i quant de temps, actualment es recomana administrar Amoxicilina. És convenient que en aquestes situacions i abans de que li practiquin qualsevol tècnica o intervenció quirúrgica, recordi a tots el metges (pediatres, cirurgians, otorrinolaringòlegs, odontòlegs, etc.) que el seu fill/a té un defecte cardíac. Tanmateix, informi-l's si és al·lèrgic a la penicil·lina per que puguin triar el millor antibiòtic. Procedint així es reduirà al mínim el risc pel seu fill/a.